



培植方法

非洲紫羅蘭是不喜陽光直接照射的植物，故十分適合室內種植，祇需於夏季室內有冷氣調節，如果能於澆水、施肥、培養土及殺蟲各方面善於掌握運用，它便會整年開花，增添不少生活樂趣。

在澆水的問題上，需隔幾天才施行呢，這方面則受季節之轉變，及種植環境所影啊，在夏季裏空氣濕度高，水分不易蒸發，澆水便要視乎盆內之培養土的重量及其表層之色澤，培養土之重量變輕及泥面之色澤較淺色，則此時便加澆水了。若澆水過量，植株之根部長期受浸而遭破壞，原來白色的根便變成深棕色，植株外圍之葉因水分蒸發了而得不到補充而變軟，此時補救之法，便需將受損之根部切除，及將外圍之葉子切去，而重新種植，還有澆水不可使葉面沾了水，若是便需用吸水紙將水珠吸去，因為水珠在陽光下便產生聚光之效，葉面細胞因受熱而受傷，便變成白斑。

在施肥方面，應宜淡不宜濃，按說明書上之份量減半施用，於每次澆花時加於水內，根據植物生態之需要，生葉需要氮，開花需要磷，生根則要鉀，於每次澆水時使用不同肥料，還有可每月一次向葉底直接噴射肥料，但份量則需減為四份之一，若施肥過度，植株中心便，生長畸形，此時便不可施肥，應用清水澆水，直至植株康復才可施肥。

由於香港氣候大半年是空氣濕度高，故培養土宜為疏水性，理想混合之成份是兩份腐葉土，兩份珍珠石，壹份金泥，少量木炭

及少量蛋殼碎，木炭是用作吸有害之氣體，而蛋殼之用途是中和培養土之酸性，植株種植一段時間後，植料便變為多酸性，此時便需更換植料，迷你型每三個月便更換植料一次，而其它品種則每六個月換植料一次。

此外殺蟲需每月一次施行，每次交替使用不同之殺蟲藥，使害蟲不能產生免疫力。

植料成份:

金泥	4份
5號日本珠石	4份
草泥	2份

